ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ФАРИНГОСПРЕЙ

Торговое название препарата: Фарингоспрей
Действующие вещества: гексэтидин
Лекарственная форма: спрей орофарингеальный, раствор.
Состав:
1 мл спрея содержит:
активное вещество: гексэтидин 1,92 мг;
вспомогательные вещества: сахарин натрия; эвкалиптовое масло; масло цветков апельсина; масло мяты перечной; левоментол; метилсалицилат; глицерин 85%; этанол 96%.
Описание: прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость с характерным запахом этанола и эфирных масел.
Фармакотерапевтическая группа: антиинфекционные средства и антисептики для местного применения.
Код АТХ: A01AB12.

Фармакологические свойства
Фарингоспрей - антисептический препарат с умеренным обезболивающим эффектом. Гексэтидин - вещество с бактерицидными и фунгицидными свойствами, является основным активным компонентом препарата. Механизм действия определяется структурным сходством с тиамином. Благодаря конкурентному ингибированию он блокирует синтез тиаминпирофосфата, необходимого коэнзима для жизненно важных процессов микроорганизмов. Участвуя в гликолитических процессах, он снижает кислотное брожение пищевых остатков в полости рта. Гексэтидин, а также частично эфирные масла, дополняют терапевтический эффект препарата небольшим местным анестетическим эффектом.
Фармакокинетика
Гексэтидин хорошо удерживается на поверхности слизистых; всасывание при применении в области носоглотки минимально. При исследованиях с радиомеченным гексэтидином, время удерживания гексэтидина на тканях ротовой полости достигало более 10 часов после однократного применения, а в нескольких случаях следы гексэтидина определялись после 65 часов.

Показания к применению
Дезинфекция полости рта и глотки в случае воспалительных и инфекционных заболеваний, таких как тонзилит, фарингит, гингивит, пародонтоз, стоматит, глоссит, афты а также для дезинфекции до и после тонзилэктомии, удаления зубов и других хирургических вмешательств в полости рта, устранение неприятного запаха изо рта, поддерживающее лечение стрептококковой ангины при сопутствующем лечением антибиотиками.
Фарингоспрей применяется у взрослых и детей в возрасте старше 8 лет.

Способ применения и дозы
Применяется местно.
Применение для ротовой полости.
При применении препарата необходимо задержать дыхание.
Не рекомендуется вдыхание препарата.
Недопустимо попадание в глаза.

Взрослые и дети старше 8 лет
Назначается одно распыление два раза в день, желательно утром и вечером, после еды; при необходимости дозу можно увеличить максимум до 2 распылений 3 раза в день.
Гексэтидин удерживается на поверхности слизистых, что обеспечивает длительный эффект. Поэтому рекомендуется использовать препарат после еды.
Длительность лечения не должна превышать 5 последовательных дней. Продление лечения более этого промежутка возможно только при консультации врача.
Пожилые
Рекомендуется та же дозировка как у взрослых.

Побочные действия
Конвенция MedDRA по частоте
Очень частые (≥1/10)
Частые (≥1/100 и <1/10)
Нечастые (≥1/1000 и <1/100)
Редкие (≥1/10000 и <1/1000)
Очень редкие (<1/10000)
С неизвестной частотой (не могут быть оценены на основе имеющихся данных).
Общие расстройства и нарушения в месте введения
Очень редкие:
Ощущение жжения.
Нарушения со стороны иммунной системы
Очень редкие:
Могут возникнуть аллергические реакции, такие как зуд, сыпь, покраснение в месте применения, отёк, ларингоспазм, отёк Квинке, бронхоспазм;
С неизвестной частотой:
Раздражение (как например, описаны воспаление и зуд в полости рта).
Нарушения со стороны нервной системы
Очень редкие:
Риск развития судорог у детей, возможное появление беспокойства и рассеянности у пожилых или при превышении дозировки, из-за присутствия производных терпенов как вспомогательных веществ в составе препарата.

Противопоказания
- гиперчувствительность к гексэтидину или к любому из вспомогательных веществ препарата;
- ларингит из-за возможного ларингоспазма;
- первый триместр беременности;
- сухой фарингит атрофического типа;
- дети в возрасте до 8 лет.

Лекарственные взаимодействия
Одновременное или последовательное применение других антисептиков следует избегать из-за возможного развития взаимодействий (антагонизм, инактивация, др.), особенно с анионными производными. Гексэтидин инактивируется в щелочных растворах.

Особые указания
Не рекомендуется вдыхание препарата.
Недопустимо попадание в глаза.
Назначается детям старше 8 лет, и только в тех случаях, когда ребенок не сопротивляется устройству с распылительным клапаном, и должен уметь задерживать дыхание в момент

впрыскивания спрея.
Терапевтические показания не объясняют длительное лечение, из-за риска развития нарушения микрофлоры ротовой полости.
Лечение необходимо возобновить, если симптомы присутствуют более 3 дней и/или ассоциированы с повышением температуры тела.
Этот препарат содержит во вспомогательных веществах и производные терпенов, которые снижают порог судорожной готовности и, в чрезмерных дозах могут определить возникновение судорог у детей; необходимо учитывать наличие этих вспомогательных веществ и у пациентов с эпилепсией в анамнезе.
Соблюдать дозы и длительность лечения.
Необходима консультация врача при одновременном применении с другими препаратами и в случаях передозировки.
Препарат содержит 78% об/об этанола 96%.
Применение при беременности и период лактации
Препарат противопоказан в первом триместре беременности.
Возможно применение препарата во втором и третьем триместре беременности и в период грудного вскармливания пользы и риска после назначения препарата, учитывая факт что нет достаточных данных относительно проникновения плацентного барьера и выведения в грудное молоко. Поэтому, необходимо рассмотреть потенциальные риски и преимущества применения перед лечением и только после этого назначать препарат, если это абсолютно необходимо.
Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами
Не рекомендуется управлять транспортными средствами или обслуживать механизмы в течение 30 минут после применения препарата.
Препарат содержит этанол, поэтому использование препарата у этой категории людей может искажать результаты тестов на алкоголь.

Передозировка
Не было сообщений о случаях передозировки.

Форма выпуска
Спрей орофарингеальный 1,92 мг/мл, по 30 мл во флаконах из стекла, герметично укупореных при помощи устройства с распылительным клапаном и прозрачным колпачком. По одному флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению в индивидуальных картонных коробках.

Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25°С.
Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света и влаги.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Название и адрес производителя
КП „Флумед-Фарм” ООО, Республика Молдова
ул. Четатя Албэ 176, мун. Кишинев,
Тел.: (+373 22) 52 14 52
Е-майл: flumed-farm@hushmail.com

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан
ООО «NIKA PHARM»,
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 7-проезд ул. Сайрам 48-А.
Тел: +998 78 150 86 68; Факс: +998 78 150 84 48.
www.nikapharm.uz