

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ РОНТО®

**Торговое название препарата:** РОНТО®

**Действующее вещество (МНН):** ---

**Лекарственная форма:** глазные капли

**Состав:**

*активные вещества:*

Пантенол (0,100%),

Витамин В<sub>6</sub> (0,050%),

Калия L-аспартат (1,000%),

Дикалия глицирризинат (0,100%),

Хлорфенираминамалеат (0,010%),

Натрия хондроитин сульфат (0,100%),

Тетрагидрозолина гидрохлорид (0,010%)

*вспомогательные вещества:* ε-аминокапроновая кислота, l-Ментол, d-Камфора, Эвкалиптовое масло, Масло мяты, Пропиленгликоль d-Борнеол, Гераниол, Концентрированный раствор бензалкония хлорида 50, Хлоробутанол, Ди-натрия эдетат гидрат, Натрия хлорид, Полисорбат 80, Этанол, Очищенная вода.

**Описание:** прозрачный бесцветный или слегка желтоватого цвета раствор.

**Фармакотерапевтическая группа:** средство, преимущественно применяемое в офтальмологии.

**Код АТХ:** S01GA52

### Фармакологические свойства

Мульти активная формула основана на сбалансированной комбинации 7 активных ингредиентов

Активные ингредиенты	Действие	
Пантенол	• Повышает метаболизм клеток глаз	➤ Питает глаза, помогает предотвратить и облегчить глазное напряжение
Витамин В6	• Улучшает и активизирует дыхание клеток глаз	
Калия L-аспартат		
Тетрагидрозолина гидрохлорид	• Устраняет конъюнктивальную гиперемия	➤ Способствует четкости и ясности зрения
Хлорфенираминамалеат	• Антигистаминный эффект	➤ Успокаивает зуд в глазах
Дикалияглицирризинат	• Сильный противовоспалительный эффект	➤ Эффективно предотвращает заболевания глаз
Натрия хондроитин сульфат	• Увлажнение глаз	

**Фармакокинетика:** Нет данных.

### Показания к применению

Зрительное напряжение (переутомление глаз), конъюнктивальная гиперемия, офтальмия из-за УФ и другого излучения (например, снежная слепота), нечеткость зрения (вызванная выделениями и пр.), зуд в глазах, блефарит (воспаление век), предотвращение заболеваний после плавания или из-за попадания пыли или пота в глаза, дискомфорт из-за использования жестких контактных линз, увлажнение глаз.

### Способ применения и дозы

1. Вымойте руки.
2. Поднимите голову вверх, опустите веко.

3. Закапайте капли в глаза.

\* Не касайтесь ресниц и век кончиком контейнера.

4. Закройте глаза приблизительно на минуту. Слегка надавите пальцами на внутренние уголки глаз.

\* Закапывайте 2-3 капли, 5-6 раз в день.

### **Побочные действия**

Припухлость глаз, зуд, покраснение или другие симптомы, как жжение.

### **Противопоказания**

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом в следующих случаях: сильная боль в глазах. Наличие аллергических симптомов, вызванных глазными каплями. Глаукома. Непрерывное медицинское лечение.

### **Лекарственные взаимодействия**

Если иное не назначено врачом, не используйте одновременно с другими глазными каплями.

### **Особые указания**

- Указанная доза и дозировка должны быть строго соблюдены.
- Дети должны использовать данный препарат под наблюдением взрослых.
- Не применять данный препарат, при ношении мягких контактных линз.
- Данный препарат должен использоваться только для закапывания.

### **Применение при беременности и период лактации**

Перед применением обратитесь к врачу или фармацевту.

### **Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами**

Очень редко (0.03 ppm) происходило головокружение при применении аналогичного препарата.

### **Меры предосторожности следует соблюдать во время и после использования:**

- Если применение данного препарата вызвало опухание глаз, зуд, покраснение или другие симптомы, прекратите его использование и обратитесь к врачу или фармацевту.
- Если после использования размытость зрения не улучшилась, прекратите использование и обратитесь к врачу.

### **Меры предосторожности следует соблюдать при хранении и обработке:**

- Храните данный препарат в недоступном для детей месте
- Плотно закрывайте крышку контейнера.
- Не переливайте раствор в другую емкость, во избежание возможного неправильного применения и изменения качества.
- Не используйте данный препарат совместно с другими людьми, во избежание возможного заражения.
- Не используйте препарат после истечения срока годности (напечатанного на внешней упаковке).
- Некоторые ингредиенты могут кристаллизоваться на кончике контейнера из-за условий хранения. Сотрите их чистой марлей перед использованием.

### **Форма выпуска**

Раствор во флаконе. Один флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной коробке.

### **Условия хранения:**

Хранить в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Не замораживать.

**Срок годности:**

3 года с даты изготовления. Используйте сразу после открытия.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель:**

Rohto-Mentholatum (Vietnam) Co., Ltd.,  
VSIP Thuan An Town, Binh Duong, Вьетнам

**Владелец регистрационного удостоверения:**

Rohto Pharmaceutical Co., Ltd., Япония

**Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан**

ООО «MARI PHARM»

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Байроқтол, 15.

Тел.: +998 78 150 86 68