



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ РОНТО® ВИТАМИН

Торговое название препарата: РОНТО® Витамин

Лекарственная форма: глазные капли

Состав:

активные вещества:

Калия L-аспартат 130 мг,

Пиридоксина гидрохлорид 13,0 мг,

Натрия хондроитин сульфат 13,0 мг,

d- α -токоферола ацетат 6,5 мг,

Хлорфенираминамалеат 3,9 мг.

вспомогательные вещества: борная кислота, полиоксиэтилен гидрогенизованное касторовое масло 60, натрия борат, l-ментол, d-борнеол, динатрия эдетат, эвкалиптовое масло, очищенная вода.

Описание: прозрачный бесцветный раствор.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие офтальмологические средства

Код АТХ: S01XA

Фармакологические свойства

d- α -токоферола ацетат (натуральный Витамин E): повышает циркуляцию крови, помогает улучшить сниженную четкость зрения.

Пиридоксина гидрохлорид (Витамин B6): улучшает клеточный метаболизм в глазах, облегчает помутнение в глазах и быстро снимает зрительное напряжение.

Натрия хондроитин сульфат: восполняет слезные элементы, защищает роговицу глаза, эффективно предотвращает синдром сухих глаз.

Калия L-аспартат: активизирует клеточное дыхание глаз, способствует предотвращению и лечению зрительного напряжения.

Хлорфенирамина малеат: антигистаминный эффект, облегчает дискомфорт при покраснении и зуде глаз.

Фармакокинетика

Нет данных.

Показания к применению

- Сниженная четкость зрения
- Помутнение в глазах (из-за секрета)
- Зрительное напряжение
- Предотвращение заболеваний после плавания или из-за попадания в глаза пыли или пота
- Конъюнктивальная гиперемия
- Зуд в глазах
- Блефарит
- Воспаление глаз из-за УФ или другого излучения (например, снежная слепота)
- Дискомфорт из-за использования жестких контактных линз



Способ применения и дозы

Закапывайте 2-3 капли в пораженный глаз, 5-6 раз в день.

Побочные действия

Может вызвать такие аллергические симптомы как зуд и конъюнктивальная гиперемия. Если это произойдет, сообщите вашему врачу.

Противопоказания

Глаукома или гиперчувствительность к любому из ингредиентов.

Лекарственные взаимодействия

Если иное не назначено врачом, не используйте одновременно с другими глазными каплями.

Особые указания

- Дети должны использовать данный препарат под наблюдением взрослых.
- Для предотвращения риска загрязнения или помутнения раствора секретом или различными бактериями, не касайтесь наконечника флакона веками или ресницами.
- Данный препарат должен использоваться только для закапывания.

Применение при беременности и период лактации

Заявления о побочных эффектах у беременных и кормящих женщин, а так же для плода отсутствуют.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Отсутствует.

Меры предосторожности следует соблюдать во время и после использования:

Если проявятся следующие симптомы, прекратите использование и свяжитесь с врачом или фармацевтом:

- Если после использования появились следующие симптомы:


Область	Симптом
Кожа	Сыпь, покраснение, зуд
Глаза	Покраснение, зуд, припухлость, боль

- Если нечеткость зрения не улучшится.
- Если симптомы не уменьшились через 2 недели.

Меры предосторожности следует соблюдать при хранении и обработке:

- Храните данный препарат в недоступном для детей месте
- Не переливайте раствор в другую емкость, во избежание возможного неправильного применения и изменения качества.

- Не используйте данный препарат совместно с другими людьми, во избежание возможного заражения.
- Не используйте препарат после истечения срока годности (напечатанного на внешней упаковке).
- Некоторые ингредиенты могут кристаллизоваться на кончике контейнера из-за условий хранения. Сотрите их чистой марлей перед использованием.
- Используйте сразу после вскрытия флакона, содержимое подвержено загрязнению во время использования.
- Не храните другие жидкости во флаконе от препарата.



Передозировка

Соблюдайте назначенную дозировку, потому что передозировка может вызвать конъюнктивальную гиперемия. Если это произойдет, прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Форма выпуска

Раствор во флаконе. Один флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной коробке.

Условия хранения

Хранить в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года с даты изготовления.

Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Rohto-Mentholatum (Vietnam) Co., Ltd.,
VSIP Thuan An Town, Binh Duong, Вьетнам

Владелец регистрационного удостоверения:

Rohto Pharmaceutical Co., Ltd., Япония

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ООО «MARI PHARM»

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Байроктол, 15.

Тел.: +998 78 150 86 68